

250克/升 吡唑醚菌酯
乳油

农药登记证号：PD20152385



巴斯夫® 凯润®



凯润，收获精品果，打造精品菜

- **有效保护作物**：新一代甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂，具有较宽的杀菌谱和更高的杀菌活性
- **促进作物健康**：提高作物生长效率和抗逆性，提高作物的产量和品质
- **可靠的预防作用**：有效成分快速穿透、扩散在叶面，药效稳定、迅速、持效较长期



扫一扫巴斯夫微信
了解更多产品信息

 **BASF**
We create chemistry

巴斯夫® 凯润®

产品特点：

- 有效保护作物：新一代甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂，具有较宽的杀菌谱和更高的杀菌活性。
- 促进作物健康：提高作物生长效率和抗逆性。表现在：
 - ◆ 使作物更好地积累和利用碳和氮，增加体内碳水化合物和蛋白质的含量，从而提高产量和品质；
 - ◆ 通过降低作物体内乙烯的合成，提高对不良环境（如干旱、冻害、涝害等）和病菌侵害等抵抗能力。
- 可靠的预防作用：有效成分快速穿透、扩散在叶表皮且与蜡质层紧密粘连形成沉降药膜，药效稳定、迅速、持效期长。

使用技术和使用方法:

作物	防治对象	制剂用药量	施药方法
玉米	植物健康作用	30-50毫升/亩	喷雾
玉米	大斑病	30-40毫升/亩	喷雾
大豆	植物健康作用	30-40毫升/亩	喷雾
大豆	叶斑病	30-40毫升/亩	喷雾
香蕉	炭疽病、轴腐病	1000-2000倍液	浸果
香蕉	植物健康作用	1000-2000倍液	喷雾
香蕉	叶斑病、黑星病	1000-3000倍液	喷雾
黄瓜	白粉病、霜霉病	20-40毫升/亩	喷雾
西瓜	炭疽病、植物健康作用	15-30毫升/亩	喷雾
芒果树	炭疽病	1000-2000倍液	喷雾
苹果树	腐烂病	1000-1500倍液	喷淋
白菜	炭疽病	30-50毫升/亩	喷雾
草坪	褐斑病	1000-2000倍液	喷雾
茶树	炭疽病	1000-2000倍液	喷雾

- 请严格按照产品标签说明使用。
- 发病轻或作为预防处理时使用低剂量；发病重或作为治疗处理时使用高剂量。
- 建议与其它不同作用机制的杀菌剂轮换使用。

田间使用效果:

芒果 🍌

海南乐东



空白处理



吡唑醚菌酯（凯润®）处理

收获精品果，打造精品菜

香蕉 

广东湛江

香蕉叶斑病



空白处理



吡唑醚菌酯（凯润®）处理

广东湛江

香蕉黑星病



空白处理



吡唑醚菌酯（凯润®）处理

广西南宁

香蕉采后处理



空白处理



吡唑醚菌酯（凯润®）处理

广西南宁

对蕉果的安全性



空白处理



吡唑醚菌酯（凯润®）处理

黄瓜

山东寿光

黄瓜白粉病



空白处理



吡唑醚菌酯 (凯润[®]) 处理



空白处理



吡唑醚菌酯 (凯润[®]) 处理

玉米

山东济南

玉米植物
健康作用



空白处理

吡唑醚菌酯 (凯润[®]) 处理



空白处理

吡唑醚菌酯 (凯润[®]) 处理



空白处理

吡唑醚菌酯 (凯润[®]) 处理



空白处理

吡唑醚菌酯 (凯润[®]) 处理

茶叶

福建安溪



空白处理

吡唑醚菌酯 (凯润[®]) 处理



空白处理

吡唑醚菌酯 (凯润[®]) 处理