

农药登记证号：PD39-87

巴斯夫® 灭百可®

100克/升 顺式氯氰菊酯
乳油

杀虫剂

活性高，击倒快！

- 杀虫谱广，能快速消灭大多数害虫
- 杀虫活性高，击倒速度快
- 对成虫、幼虫及卵都有明显的防治作用
- 进口菊酯，品质保证



扫一扫巴斯夫微信
了解更多产品信息

BASF
We create chemistry

沪（浦）农药广审（文）20180057

产品特点：

- 杀虫谱广，能快速消灭大多数害虫
- 杀虫活性高，击倒速度快
- 对成虫、幼虫及卵都有明显的防治作用
- 进口菊酯，品质保证

使用技术和使用方法：

作物	防治对象	制剂用药量	使用方法
甘蓝	菜青虫、小菜蛾	5-10毫升/亩	每季作物最多用药3次，安全间隔期为3天，并可与卡死克®轮用。
柑橘树	潜叶蛾	10000-20000倍液	在新稍期用药二次，间隔5-7天，每季作物最多使用3次，安全间隔期为7天。
黄瓜	蚜虫	5-10毫升/亩	每季作物最多用药2次，安全间隔期为3天。
豇豆	大豆卷叶螟	10-13毫升/亩	每季作物最多用药2次，安全间隔期为5天。
棉花	红铃虫、棉铃虫	6.5-13毫升/亩	在棉铃虫卵孵化期，幼虫蛀入蕾铃之前或中/高抗性棉区棉田一代棉铃虫发生初期用药，间隔7天，每季作物最多使用3次，安全间隔期为14天。

- 按上述推荐剂量，加适量的水搅拌均匀成乳白状液体，喷雾处理。
- 不要与强碱性农药如波尔多液等混用。
- 可以与非菊酯类农药轮用。

杀虫谱：



菜青虫



小菜蛾



潜叶蛾



大豆卷叶螟



棉铃虫



红铃虫

声明：

此标签上所述本药剂的使用说明，是根据专家们经实地试验和使用结果的意见。使用方法是可靠的。表明了应该遵守的注意事项。厂家只能保证标签中所记载之化学成份，品质及所列使用方法。厂家不能负责在任何其它明文和暗含的保证，包括标签中记载以外的方法应用或目的外销售所产生的一切问题。