

农药登记证号：PD20101017

巴斯夫® 翠泽®

300克/升 醚菌·啉酰菌
悬浮剂

杀菌剂



早用翠泽，白粉不得

- 对黄瓜、甜瓜及草莓白粉病具有良好防效
- 作用迅速、持效期较长
- 传导性好



扫一扫巴斯夫微信
了解更多产品信息

BASF
We create chemistry

沪（浦）农药广审（文）20180061

产品特点：

- **对白粉病特效：**对黄瓜、甜瓜，草莓及苹果等各种作物的白粉病以及葡萄穗轴褐枯病具有较好的防治作用。
- **对作物安全：**作用迅速、持效期较长，按标签推荐剂量使用对作物安全。
- **传导性好：**除了被叶片吸收以外，翠泽[®]还能被作物根部少量吸收同时发挥作用，有一定的向顶传导性和较好的跨膜传导性。

使用技术和使用方法：

作物	防治对象	制剂用药量	施药方法
黄瓜	白粉病	45-60毫升/亩	喷雾，发病前或发病初期用药，连续施药3次，间隔7-14天。每季节最多用药3次，安全间隔期为2天。
甜瓜	白粉病	45-60毫升/亩	喷雾，发病前或发病初期用药，连续施药3次，间隔7-14天。每季节最多用药3次，安全间隔期为3天。
草莓	白粉病	25-50毫升/亩	喷雾，发病前或发病初期用药，连续施药3-4次，间隔7-14天。每季节最多用药3次，安全间隔期为7天。
苹果树	白粉病	2000-4000倍	喷雾，发病前或发病初期用药，连续施药3次，间隔7-14天。每季节最多用药3次，安全间隔期为7天。
葡萄	穗轴褐枯病	1000-2000倍液	喷雾，发病前或初期进行茎叶均匀喷雾，重点喷施果穗，连续施药3次，间隔7-10天。每季节最多用药3次，安全间隔期为7天。

- 预防处理时使用低剂量；防病时视病害情况使用推荐剂量。
- 建议翠泽可与其它不同作用机制的杀菌剂轮换使用。

试验效果对照：

