

农药登记证号：PD20070370

巴斯夫® 百垄通®

240克/升 甲咪唑烟酸
水剂
除草剂

斩草除根 香附子难再生

- 杀草谱广，有效防除或抑制花生田禾本科及莎草，对香附子高效
- 持效期长，用药后控制杂草长达三个月



花生田专用除草剂



扫一扫巴斯夫微信
了解更多产品信息

BASF
We create chemistry


沪（浦）农药广审（文）20180060

巴斯夫® 百垄通® 斩草除根，香附子难再生

产品特点：

- 杀草谱广：一次用药可同时防治多种单、双子叶杂草。
- 持效期长：一次用药可以控制整个生长季节的杂草。
- 施药时间灵活：可播后苗前或苗后早期处理，对已出土和未出土杂草均有效。
- 内吸传导性好，斩草除根。
- 可控制恶性杂草**香附子**地下根茎的再生活性，**有效减少第二茬作物田香附子发生数量。**

香附子



杀草谱：

- 按标签推荐剂量，每季使用一次，即可防除或抑制春、夏花生田中以下杂草：

禾本科杂草及莎草：稗草、马唐、牛筋草、狗尾草、莎草包括香附子等。

阔叶杂草：苋、藜、蓼、苘麻、丁香蓼、马齿苋、龙葵、荠菜、碎米荠、牛繁缕、苍耳等。



推荐使用方法：

使用时期	药剂用药量	用水量	备注
播后苗前	百垄通16-24毫升	30-45升	
苗后早期	百垄通20-30毫升	30-45升	阔叶杂草3-5厘米，禾本科杂草2-4叶期

- **注意事项：**百垄通是花生专用除草剂，避免喷洒其他作物。
- **喷雾处理：**兑水量每亩30-60升。土壤湿度对药效发挥非常重要，当湿度不理想时，应使用高兑水量，中耕除草应在施药14天后进行。

后茬作物安全间隔期：

- 使用百垄通4个月后，可播种小麦。
- 使用百垄通9个月后，可播种玉米、大豆、烟草。
- 使用百垄通18个月后，可播种大麦、燕麦、谷子、棉花、甜玉米。
- 其它作物轮作间隔期正在试验中。