

农药登记证号：PD20181209

巴斯夫® 乾运®

30% 噻唑锌
悬浮剂

杀菌剂

细菌药 乾运到 更安全 真有效



溃瘍病
细菌性角斑病

细菌性角斑病

细菌性角斑病
溃瘍病

细菌性条斑病

溃瘍病



BASF

We create chemistry

产品特点：

- **安全：**→ 对作物安全：柑橘、黄瓜、水稻上可放心使用
→ 各生育期使用安全：可在作物各生育期安全使用
→ 混用安全：除一些强酸强碱类农药外，乾运可以在推荐剂量下和市面上多种药剂混用，省工省力
→ 对环境安全：不会诱发红蜘蛛爆发，毒性低、无抗生素累积风险、抗性风险低
- **高效：**预防加治疗双重作用
- **广谱：**对溃疡病、细菌性角斑和细菌性条斑病有较好效果
- **补锌：**富含有机锌，壮苗、靓果

推荐使用方法：

作物(或范围)	防治对象	制剂用量	使用方法
柑橘树	溃疡病	500-750倍液	喷雾
黄瓜(保护地)	细菌性角斑病	83-100毫升/亩	喷雾
水稻	细菌性条斑病	67-100毫升/亩	喷雾

- 请严格按照产品标签说明使用。
- 本品应在病害发生初期使用，若病情严重，应在登记的剂量范围内适当增加用量。
- 使用时，先用少量清水将悬浮剂配成母液，并充分搅拌至完全溶解，倒入已盛一半水的喷雾器中，将药液搅拌均匀，再倒其余的水。施药时喷雾应均匀、周到。

试验效果对照：



空白对照



噻唑锌（乾运[®]）处理



空白对照



噻唑锌（乾运[®]）处理



空白对照



噻唑锌（乾运[®]）处理