

43% 唑醚·氟酰胺
悬浮剂


农药登记证号：PD20182675



巴斯夫® 颖多®

增活力 赢多粒

- ✓ 专利成分，杀菌谱广
- ✓ 独特配方，全新作用机制，保护兼治疗，持效期长
- ✓ 独特的施乐健植物健康作用



扫一扫巴斯夫微信
了解更多产品信息

 **BASF**
We create chemistry

沪（浦）农药广审（文）20180076

产品介绍：

- 颖多是德国巴斯夫公司推出的创新型杀菌剂，将最新一代琥珀酸脱氢酶抑制剂氟唑菌酰胺与吡唑醚菌酯进行混配，氟唑菌酰胺是羧酰胺类杀菌剂，为琥珀酸脱氢酶抑制剂，具有内吸、传导性，兼具保护和早期治疗活性，可防治**多种作物上的多种真菌性病害**。吡唑醚菌酯是甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂，作用速度快，施药几分钟即可穿透到叶片中，有效成分在叶肉组织内扩散，并在叶片上形成沉降药膜，与蜡质层紧密粘连，能有效控制叶片中的病原孢子，兼具预防作用和早期治疗作用，持效期较长。


产品介绍：

- 防效优异：**可有效防治多种玉米上的大斑病。
- 持效期长：**可持久保护作物免受病害侵扰
- 独特的施乐健植物健康功能：**增强作物活力，延缓衰老，且有效抵御外部逆境，促进作物体内干物质转化
- 卓越的抗性管理工具：**双作用位点，有效延缓抗性产生

使用技术和使用方法：

作物	防治对象	制剂用药量	施药方法及注意事项
玉米	大斑病	16-24毫升/亩	发病初期用药，间隔7-10天1次，连续使用2-3次。每季作物最多施药3次，安全间隔期21天。

田间表现：



空白

常规对照

吡唑醚菌酯 (颖多) 处理

——2018年黑龙江大庆



常规对照

吡唑醚菌酯 (颖多) 处理

——2018年黑龙江阿城试验点



常规对照

吡唑醚菌酯 (颖多) 处理

——2018年吉林农场验点



常规对照

吡唑醚菌酯 (颖多) 处理

——2018年吉林农场验点