

农药登记证号：PD20190011

京农药广审（文）2019037

# 巴斯夫® 英雷®

75克/升 阿维菌素·双丙环虫酯  
可分散液剂

杀虫剂



## 全新机理 万无一虱

- ✓ 新机理：双丙环虫酯具备全新作用机理
- ✓ 复配高品质阿维菌素，协同增效，双重作用机制防治烟粉虱



**□ · BASF**  
We create chemistry

### 产品简介：

- 双丙环虫酯为全新作用机理，IRAC将其划分为同翅目昆虫摄食阻滞剂的9D亚族。其通过胃毒和触杀作用快速阻止害虫进食，导致害虫饥饿死亡。叶面喷雾使用可以防治刺吸式害虫如蚜虫、粉虱。阿维菌素是一种大环内酯双糖类化合物，是从土壤微生物中分离的天然产物，对昆虫和螨类具有触杀和胃毒作用并有微弱的熏蒸作用。

### 产品特点：

- 新机理：双丙环虫酯具备全新作用机理，有效防治抗性烟粉虱
- 复配高品质阿维菌素，协同增效，双重作用机制防治抗性烟粉虱

### 推荐使用方法：

| 作物 | 防治对象 | 制剂用药量     | 使用方法 |
|----|------|-----------|------|
| 黄瓜 | 蚜虫   | 9-13毫升/亩  | 喷雾   |
| 辣椒 | 烟粉虱  | 45-53毫升/亩 | 喷雾   |
| 番茄 | 烟粉虱  | 45-53毫升/亩 | 喷雾   |

- 须按标签中说明使用，大风天或预计1小时内降雨，请勿施药。傍晚施药更有利于药效的充分发挥。
- 黄瓜：黄瓜蚜虫发生初期喷雾处理，每季作物最多用药2次，施药间隔为3-7天，安全间隔期为3天。
- 辣椒：辣椒烟粉虱发生初期喷雾处理，每季作物最多用药2次，施药间隔为3-7天，安全间隔期为5天。
- 番茄：番茄烟粉虱发生初期喷雾处理，每季作物最多用药2次，施药间隔为3-7天，安全间隔期为5天。

### 试验效果对照：

