

农药登记证号：PD20152030

# 巴斯夫® 排草丹®

480克/升 灭草松  
水剂

除草剂

## 大品牌，老朋友

德国品质  
安全标杆

经典品牌  
效果可靠

标注科学  
易于使用

克制稻田抗性阔叶草莎草之首选



1升=  
1190克



刺儿菜



三棱草



泽泻



扁杆蔗草



扫一扫巴斯夫微信  
了解更多产品信息

**BASF**

We create chemistry

### 排草丹的杀草谱：

- 主要用于防除阔叶杂草和莎草科杂草，对禾本科杂草无效。
- 灭草松可以有效防治花生、马铃薯、大豆田中的马齿苋、鳢肠、打碗花、米莎草、藜、蓼、龙葵、苋属、苍耳属、鸭跖草属、苘麻、荠菜、曼陀罗、野西瓜苗、硬毛刺苞菊、野芝麻属、繁缕、牛蒡菊属（在第三叶期或以前）、宾洲蓼、细万寿菊、全叶家艾、田蓟、猪殃殃、芸苔属、乾花属、母菊属、野生萝卜、刺黄花穗、大麻、铁荸荠、向日葵、酸浆属、野芥等旱田杂草。
- 尤以对旱田中苍耳、水田中矮慈菇、野慈菇为特效，对问荆防效明显优于其它药剂。

### 杂草图谱



### 使用技术和使用方法：



移栽水稻田  
莎草、阔叶杂草  
150-200 毫升/亩



大豆田  
阔叶杂草  
156-208毫升/亩



花生田  
一年生阔叶杂草  
150-200 毫升/亩



马铃薯田  
一年生阔叶杂草  
150-200 毫升/亩

### 注意事项

- 需严格按照标签说明使用。
- 请遵守常规农药施药注意事项。
- 如本地无某一作物的使用经验，请先按排小区试验。
- 施药适期：苗后早期，杂草旺长的2 - 6叶期施药，特别的鸭跖草防治应在1~2叶期。
- 排草丹在温暖晴天活性高，除草效果好，反之阴天和气温低时影响药效。白天20-28度为最佳用药温度，65%的湿度为最佳用药时期。
- 极度干旱、霜冻、水涝、盐碱地情况下作物经受逆境影响，不宜使用排草丹，以防发生药害
- 保证喷雾质量，推荐使用扇形喷头，均匀喷雾至所有杂草叶片，喷水量不少于 每公顷200升。
- 与苗后茎叶禾本科除草剂桶混后应立即施药，或利用植物油助剂减少拮抗风险。
- 施药后8小时内降雨可能影响药效。