

巴斯夫® 英威®


50克/升 双丙环虫酯
可分散液剂

杀虫剂

即刻停食 十分有效

- ✓ **全新**：全球杀虫剂机制9D类杀虫剂成分，全新机理
- ✓ **迅速**：蚜虫迅速停止取食，减少病害传播
- ✓ **持效**：杀虫活性较高，持效期较长

新成份



扫一扫巴斯夫微信
了解更多产品信息



BASF

We create chemistry

产品介绍：

- 双丙环虫酯为全新作用机理，IRAC将其划分为同翅目昆虫摄食阻滞剂的9D亚族。其通过胃毒和触杀作用快速阻止害虫进食，导致害虫饥饿死亡。叶面喷雾使用可以防治刺吸式害虫如蚜虫。

产品特点：

- **全新**：全球杀虫剂机制9D类杀虫剂成分，全新机理
- **迅速**：蚜虫迅速停止取食，减少病害传播
- **持效**：杀虫活性较高，持效期较长

推荐使用方法：

作物	防治对象	制剂用药量	使用方法
棉花	蚜虫	10-16毫升/亩	喷雾
苹果	蚜虫	20000-12000倍液	喷雾

- 须按标签中说明使用，使用前需摇匀。大风天或预计1小时内降雨，请勿施药。傍晚施药更有利于药效的充分发挥。
- 棉花：棉田棉蚜发生初期喷雾处理，每季作物最多用药2次，安全间隔期为21天。
- 苹果：苹果蚜虫发生初期喷雾处理，每季作物最多用药2次，安全间隔期为21天。

试验效果对照：



空白对照

双丙环虫酯（英威）处理



空白对照

双丙环虫酯（英威）处理

空白对照

双丙环虫酯（英威）处理



空白对照

双丙环虫酯（英威）处理

空白对照

双丙环虫酯（英威）处理