

农药登记证号：PD20080470

巴斯夫® 莎阔丹®

460克/升 2甲·灭草松
可溶液剂

除草剂

叶根通杀，轻松彻底



BASF

We create chemistry

产品特点：

- 杀草谱广，对水稻田的恶性莎草科杂草及阔叶杂草有很好的防除效果，对三棱草特效
- 作用迅速，施药后3-5天即可见效，高温情况下2天即可见效
- 除草彻底，触杀兼传导性选择除草剂，对杂草根系有杀伤作用，提高除草效果
- 配方先进，质量稳定，不受耕种条件和耕作模式的影响，对环境安全

推荐使用方法：

请严格按照产品标签说明使用

作物	防治对象	制剂用量	使用方法
水稻田(直播)	莎草科杂草 阔叶杂草	133-167毫升/亩	喷雾
水稻移栽田			

注意事项：

- 在早上无风或微风条件下施药更有效。施药后6小时内降雨会降低药效
- 避免稻苗细弱、直播水稻4叶期前使用
- 最适当的施药期为2-5叶期的幼嫩杂草，施药前排水，使杂草全部露出水面
- 如果水稻田中除阔叶草和莎草外还有稗草等禾本科杂草危害时，建议将莎阔丹[®]和稻田禾本科除草剂混用

水稻田常见莎草和阔叶杂草：

