

农药登记证号：PD20070342

# 巴斯夫® 阿克白®

50% 烯酰吗啉  
可湿性粉剂

杀菌剂



## 霜霉, 疫病时常来 治疗还得阿克白

- 预防效果优秀，消灭初期侵染源
- 治疗效果可靠，杀灭病菌菌丝
- 混配性佳，使用灵活



扫一扫巴斯夫微信  
了解更多产品信息

**BASF**  
We create chemistry

沪(浦)农药广审(文)20190013

### 产品特点：

- 阿克白®从三方面防治霜霉病和疫病。
  - **预防作用**：抑制游动孢子的萌发并导致其死亡，消灭初期侵染源。
  - **治疗作用**：具有很强的渗透作用，渗入叶片组织，杀灭真菌菌丝。
  - **抗产孢作用**：阻止孢子的形成，减少病菌再侵染的可能。
- 持效期较长，可减少总用药次数。
- 渗透作用强，耐雨水冲刷。

阿克白®能在较短时间内渗入叶片组织，并能局部扩散，受雨水冲刷的影响很小，用药1小时后降雨对药效几乎没有影响。

- 阿克白®内吸传导能力强，根部灌施，可以内吸传导至整个植株。
- 混配性佳，使用灵活。

### 使用技术和使用方法：

作物	防治对象	制剂用药量	施药方法
黄瓜	霜霉病	30-40克/亩	喷雾
辣椒	疫病	30-40克/亩	喷雾
烟草	黑胫病	27-40克/亩	喷雾

- 请严格按照产品标签说明使用。
- 病害轻度发生或作为预防处理时使用低剂量，病害发生较重或发病后使用高剂量。
- 每季作物使用阿克白®杀菌剂不要多于3次。如果超过3次使用，请与其他不同作用机制的杀菌剂桶混或轮换使用。

### 试验效果对照：

2006，山东潍坊

